



あぶない

石川県子ども事故予防通信

身のまわりの事故に注意

誤飲編

赤ちゃんは生後5ヶ月ごろから手にもったものを何でも口にいます。



事故は家の中の特にリビング（居間）でもっともおきています。

何も飲ませず吐かせない

- 石油製品
（灯油・マニキュア・
除光液・液体の殺虫剤 など）
- ボタン電池
- 防虫剤の樟脳（しょうのう）



たくさん飲みこんで
しまったら!!

すぐに
病院へ

水や牛乳を飲ませて吐かせない

- 漂白剤 ● 石けん ● シャンプー
- ボディシャンプー ● シャボン玉液
- 酢 ● 生石灰
- 強酸性・強アルカリ性洗剤
（トイレ用・排水パイプ用・換気扇用 など）



水や牛乳を飲ませて吐かせる

- 大部分の医薬品 ● 芳香剤
- 香水 ● 化粧水 ● 花火
- ホウ酸団子 ● たばこを浸した液体
- 酒・アルコール類
- 弱酸性・中性・弱アルカリ性洗剤
（台所用・洗濯用・風呂用・おむつ用 など）



何も飲ませず吐かせる

- たばこ（吸い殻・葉）

中毒性が
ほとんど
ないもの

- シリカゲル ● □ ● 紅 ● マ ッ チ
- 紙おむつ ● 鉛 ● 筆 ● 消しゴム
- マジック ● クレヨン ● 線 ● 香
- カイロ



最近のおもちゃに注意！



● 磁石でくっつく おもちゃ

複数個のみ込むと腸を挟んでくっついて、胃や腸に穴を開けてしまう事故や腸閉塞を起こします



● 吸水樹脂ボール

（水でふくらむおもちゃ
やインテリア用品など）

のみ込むとおなかの中で膨らんで腸閉塞を起こします

たばこ誤飲

- 紙巻たばこ：従来からある、たばこ葉を紙で細く巻きあげたもの。飲み込んだたばこが2cm以下の場合、吐かせる必要はありません。2cm以上の場合、（できれば吐かせて）病院を受診してください。水に浸かったたばこや、その水溶液を飲んだ場合は、すぐに病院へ。
- 加熱式たばこ：カートリッジの中に紙巻きたばこ約1本分のたばこ葉が入っています。
- 電子たばこ：日本では一般的に液体の中にニコチンは含まれていませんが、ホルムアルデヒドなどの有害物質が含まれている可能性があります。加熱式たばこ、電子たばこを飲み込んだ場合は医療機関を受診してください。



誤飲・誤嚥を防ぐために

子供の口の大きさは

約4cm




トイレット
ペーパーの
芯の直径と
ほぼ同じ

直径
約4cm

出典：政府広報オンライン

誤飲チェッカー

直径39mm




誤飲チェッカー
の中に隠れる
ものは飲み込む
危険があります。

子供の手の届く範囲は

「台の高さ+手の届く範囲」

- 1歳児：約90cm
- 2歳児：約110cm
- 3歳児：約120cm



部屋や身の周りの片付けを行い、事故を未然に防ぐことが重要です。口径39mm以下の大きさの物は飲み込んだり、窒息する恐れがあるため、床からの高さが1m以上の子どもの手の届かない場所に置きましょう。

中毒110番 一般専用電話 判断に迷ったら問い合わせを！

※あわせて誤飲したものを手に持って、お子さんの年齢や体重、誤飲したものの正確な名称、飲んだ量など事故の状況をお伝えください。

大 阪：072-727-2499

365日
24時間対応

つくば：029-852-9999

365日
9～21時対応

化学物質（たばこ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒などによる中毒事故が実際に起きて、どう対処したらよいかわかった時にご相談ください。応急手当や受診の必要性を薬剤師、獣医師がアドバイスします。

ただし、異物誤飲（プラスチック、石、ビー玉など）や食中毒、慢性的中毒（アルコール中毒、シンナー中毒など）や医薬品の常用量での副作用についての相談には応じていません。

たばこ誤飲事故専用電話（自動音声等による情報提供） 072-726-9922

365日
24時間対応



日本中毒
情報センター



Ishikawa
Medical Association
石川県医師会